

# ACICLOVIR GL 200 mg Comprimé

## Aciclovir

### Forme et présentation :

Comprimé rond et blanc avec une barre sur une face.

Boîte de 30 comprimés sous plaquettes thermoformées aluminium/aluminium.

### Composition :

Aciclovir ..... 200 mg.

Excipients : croscarmellose de sodium, cellulose microcristalline, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, Talc purifié.

Classe pharmacothérapeutique : Antiviral.

### Indications thérapeutiques :

ACICLOVIR GL 200 mg appartient à un groupe de médicaments appelés antiviraux. Il est indiqué dans :

Le traitement des infections dues au virus de l'Herpès simplex (VHS) et de l'Herpès Varicelle-Zona (VZV) [maladies virales, contagieuses, se manifestant par une éruption de boutons groupés sur la peau ou les muqueuses ; dont l'herpès génital primaire et récurrent et la varicelle].

Suppression des récurrences d'infections dues au VHS.

Eviter les infections dues au VHS chez les patients dont la résistance à ces infections est fortement diminuée.

ACICLOVIR GL 200 mg ne traitera pas les infections dues au VHS chez les nouveau-nés ni les infections sévères dues au VHS chez les enfants dont les défenses immunitaires sont affaiblies.

### Contre-indications :

Ne prenez jamais ACICLOVIR GL® 200 mg et prévenez votre médecin si vous êtes allergique (hypersensible) à l'aciclovir, au valaciclovir ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique « Composition ».

Une réaction allergique peut se manifester par des rougeurs cutanées, des démangeaisons ou des difficultés respiratoires. Ne prenez pas ce médicament si l'une des manifestations ci-dessus s'applique sur vous ; parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ACICLOVIR GL® 200 mg.

Précautions d'emploi et mises en garde :

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ACICLOVIR GL® 200 mg si,

Vous êtes une personne du troisième âge.

Vous souffrez de problèmes aux reins, il est possible que votre médecin adapte la dose d'ACICLOVIR GL® 200 mg.

Vous souffrez de problèmes nerveux.

Maintenez une bonne hydratation pendant le traitement à l'ACICLOVIR GL® 200 mg.

Votre médecin déterminera s'il existe un risque de déshydratation.

Vous pouvez transmettre le virus par contact corporel. Soyez particulièrement prudent, s'il y a des vésicules (éruptions de la peau contenant un liquide clair) ou des lésions visibles.

Dans tous les cas, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Prévenez votre médecin de la prise d'ACICLOVIR GL 200 mg si vous devez effectuer des analyses de sang ou d'urines.

Interactions médicamenteuses :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament y compris les médicaments achetés sans ordonnance et les plantes médicinales.

Dans tous les cas, prévenez votre médecin, particulièrement si vous prenez l'un des médicaments suivants :

Ciclosporine (utilisé chez les patients transplantés).

Théophylline (utilisé dans le traitement de l'asthme).

Probenécide (utilisé dans le traitement de la goutte).

Cimétidine (utilisé dans le traitement des acidités gastriques).

Mycophénolate Mofétil (utilisé chez les patients transplantés).

Zidovudine (utilisé dans le traitement du SIDA).

### Grossesse et allaitement :

ACICLOVIR GL 200 mg ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et/ou l'allaitement, sauf après consultation du médecin.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Effets sur la conduite et l'utilisation de machines :

Vous ne devez pas conduire un véhicule ou utiliser une machine avant de vous assurer que la prise de ce médicament n'affecte pas votre capacité à le faire.

Posologie et mode d'administration :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez utiliser ACICLOVIR GL 200 mg.

N'arrêtez pas prématurément votre traitement.

Posologie

### Utilisation chez l'adulte :

1. Traitement des infections dues au virus de l'herpès simplex (infections de la peau et des muqueuses, notamment herpès génital primaire et récurrent) :

La dose recommandée est de :

1 comprimé d'ACICLOVIR GL 200 mg, 5 fois par jour toutes les 4 heures ; la dose nocturne étant omise. Le traitement doit se poursuivre pendant 5 jours mais en cas d'infection primaire grave, un traitement de plus longue durée peut s'avérer nécessaire.

Il est important que la première prise soit faite le plus rapidement possible après l'apparition des premiers symptômes, même pour les infections dues au virus de l'herpès simplex qui récidivent régulièrement.

Ces infections sont souvent précédées d'une courte période où la réapparition des vésicules s'annonce par une sensation douloureuse ou une sensation d'engourdissement à l'endroit concerné, ou par une rougeur ou une démangeaison. Les personnes qui présentent régulièrement des infections herpétiques reconnaissent ces signes et peuvent ainsi prévoir la crise avec précision. Le traitement doit de préférence déjà débuter à ce stade, sinon immédiatement après l'apparition des premiers vésicules.

2. Atténuation des récurrences d'infections dues au virus de l'herpès simplex :

La dose recommandée est de :

- 1 comprimé d'ACICLOVIR GL 200 mg, 4 fois par jour toutes les 6 heures,

ou

- 2 comprimés d'ACICLOVIR GL 200 mg, 2 fois par jour toutes les 12 heures.

Ou encore,

- 1 comprimé d'ACICLOVIR GL 200 mg, 3 fois par jour toutes les 8 heures,

ou,

- 1 comprimé d'ACICLOVIR GL 200 mg, 2 fois par jour toutes les 12 heures.

Votre médecin déterminera la durée de votre traitement.

3. Prévention des infections dues au virus de l'herpès simplex chez les patients dont la résistance est fortement diminuée :

La dose recommandée est de : 1 comprimé d'ACICLOVIR GL 200 mg, 4 fois par jour toutes les 6 heures.

Chez les patients sévèrement fragilisés (par exemple après une transplantation de moelle osseuse) ou chez les patients présentant une absorption intestinale réduite, la dose peut être doublée et portée à 2 comprimés. Une administration I.V peut également être envisagée.

Votre médecin déterminera la durée de votre traitement.

### Utilisations chez les enfants :

1. Infections dues au virus de l'herpès simplex et prévention des infections dues au virus de l'herpès simplex chez les enfants dont la résistance est fortement diminuée :

Les enfants de plus de 2 ans recevront la même dose que les adultes.

Les enfants de moins de 2 ans recevront la moitié de la dose prévue pour les adultes.

2. Traitement de la varicelle :

Enfants de moins de 2 ans :

1 comprimé d'ACICLOVIR GL 200 mg, 4 fois par jour.

Enfants entre 2 et 6 ans :

2 comprimés d'ACICLOVIR GL 200 mg, 4 fois par jour.

Enfants de plus de 6 ans :

4 comprimés d'ACICLOVIR GL 200 mg, 4 fois par jour.

Le traitement doit se poursuivre pendant 5 jours.

Sujets âgés et patients atteints d'insuffisance rénale modérée :

Votre médecin ajustera les doses mentionnées ci-dessus.

Patients atteints d'insuffisance rénale sévère :

Il est recommandé d'ajuster la dose à 1 comprimé d'ACICLOVIR GL 200 mg, 2 fois par jour toutes les 12 heures.

Dans tous les cas, veuillez vous conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous oubliez de prendre une dose à l'heure habituelle, prenez-la dès que vous y pensez, sauf s'il est l'heure de prendre la dose suivante. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

En cas de doute, consultez toujours votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés d'ACICLOVIR GL 200 mg doivent être avalés avec un liquide. Si vous avez des difficultés à avaler, vous pouvez disperser le comprimé dans un peu d'eau puis le boire après agitation.

### Surdosage :

Si vous avez pris trop d'ACICLOVIR GL 200 mg, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (98 98 97 021).

Des doses allant jusqu'à 20 g d'aciclovir prises par voie orale ont été bien tolérées.

Des surdosages répétés pendant plusieurs jours peuvent entraîner des symptômes tels que vomissements, nausées, maux de tête et confusion.

Ce médicament est dialysable (technique permettant de nettoyer le sang).

### Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Réactions allergiques : (affectent moins d'une personne sur 1000). Si vous développez une réaction allergique à l'ACICLOVIR GL 200 mg, consultez immédiatement votre médecin.

Autres effets indésirables :

**Fréquents (moins d'une personne sur 10) :**

Fatigue, fièvre.

Etourdissement.

Diarhée, vomissement.

Maux de tête.

Nausées, douleurs abdominales.

Démangeaison.

Rougeurs de la peau et sensibilité aux rayons du soleil.

**Peu fréquents (moins d'une personne sur 100) :**

Chute de cheveux.

Urticaire.

**Rares (moins d'une personne sur 1000) :**

Difficultés respiratoires.

Réaction allergique généralisée et grave.

Maladie grave et toxique de la peau.

Réactions neurologiques réversibles incluant agitation, tremblements, manque de coordination des mouvements, difficultés d'élocution, symptômes psychotiques, affection du cerveau, engourdissement, états de confusion, hallucinations, somnolence, convulsions, coma et malaise. Ces effets surviennent habituellement chez les patients recevant une forte dose d'ACICLOVIR GL ou souffrant d'insuffisance rénale.

Modification des paramètres d'analyse du sang en rapport avec la fonction du rein et du foie.

**Très rares (moins d'une personne sur 10000) :**

Anémie (diminution du nombre des globules rouges dans le sang), diminution du nombre de globules blancs, diminution du nombre de thrombocytes (ou plaquettes, cellules permettant au sang de coaguler).

Inflammation du foie, jaunisse.

Mauvais fonctionnement des reins, douleurs dans le flanc ou dans le dos au niveau des reins.

### Conservation :

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver ce médicament à une température comprise entre "15°C et 25°C à l'abri de la lumière et de l'humidité.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus.

Liste I : Médicament soumis à prescription.

DE n° : 13/065P 15/097

Date de révision de la notice : Janvier 2015

Fabricant et détenteur de la DE : Genericlub. Zone industrielle Rouiba, voie C, BP 73, Rouiba, Alger, Algérie.