

Pinaverium 100 mg

GL®

Pinaverium



Comprimé
pelliculé

Forme et présentation :

Comprimé pelliculé dosé à 100 mg, boîte de 20 comprimés.

Composition :

Bromure de Pinavérium : 100 mg pour un comprimé.

Excipients: cellulose microcristalline, amidon de maïs prégélatinisé, talc, stéarate de magnésium, Pelliculage : alcool polyvinylique, talc, dioxyde de titane (E171), macrogol 3000, oxyde de fer rouge (E172), oxyde de fer jaune (E172).

Classe thérapeutique:

Ce médicament est un antispasmodique musculotrope.

Indications:

Il est indiqué dans les douleurs des maladies digestives ou biliaires et utilisé en vue d'une préparation au lavement baryté.

Posologie et mode d'administration:

Voie orale.

La posologie est de 2 comprimés par jour en 2 prises : 1 comprimé matin et soir au milieu des repas. Exceptionnellement, cette posologie peut être augmentée à 3 comprimés par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet du médicament est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau.

Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau.

Ne pas sucer ni croquer les comprimés. Ne pas prendre les comprimés en position allongée ni juste avant l'heure du coucher. Si vous avez oublié de prendre le médicament : prenez la dose suivante à l'heure habituelle. Ne prenez pas de dose double.

Dans tous les cas, respecter l'ordonnance de votre médecin

Contre-indications :

Allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des excipients.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde et précautions d'emploi:

Pas de précautions d'emploi nécessaires.

Interactions médicamenteuses:

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament.

Grossesse et allaitement:

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament pendant l'allaitement est déconseillée.

Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Effets indésirables:

Comme tous les médicaments, Pinavérium GL 100 mg est susceptible d'avoir des effets indésirables :

Des troubles digestifs et cutanés ont été rarement observés.

En cas d'éruption cutanée, il convient d'arrêter ce médicament et de consulter votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Conservation :

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Liste 2

Date de mise à jour : JUIN 2017

D.E. n° : 065/10E 104/14

Fabricant et Détenteur de la D.E: Generi-
clab, BP 73 voie C,
zone industrielle - Rouiba - Alger – Algérie