

Gatifloxacin GL[®]

Gatifloxacin
Solution oculaire stérile



Solution
oculaire

Composition pour 1ml:

solution ophtalmique stérile
Gatifloxacin sesquihydrate 3.22mg
(équivalent à 3.0mg de Gatifloxacin base).

Excipients : chlorure de benzalkonium, hydrogène phosphate disodique, edetate de sodium, potassium hydrogène phosphate, HCl et/ou hydroxyde de sodium, eau ppi.

Excipients à effet notoire : chlorure de benzalkonium.

Indication :

Ce médicament est indiqué dans le traitement des ulcères de la cornée, et des infections de l'œil appelées conjonctivites bactériennes chez les personnes âgées d'un an ou plus.

Posologie et mode d'administration :
On utilise habituellement les gouttes ophtalmiques de gatifloxacin pendant une période d'une semaine. Aux jours 1 et 2, utilisez une goutte à toutes les 2 heures dans l'œil ou les yeux infecté(s) pendant que vous êtes éveillé, jusqu'à 8 fois par jour. Aux jours 3 à 7, utilisez une goutte 4 fois par jour pendant que vous êtes éveillé. Vous devez espacer les doses de façon égale au cours de la journée.

Contre-indications :

Hypersensibilité à la Gatifloxacin ou à l'un de ces composants.
Une allergie à l'un des antibiotiques de la classe des fluoroquinolones (par ex. la ciprofloxacine, la lévofloxacine, la moxifloxacine, l'ofloxacine, la norfloxacine).

Mise en garde :

Ne pas injecter dans l'œil.

Ce produit ophtalmique contient du chlorure de benzalkonium (conservateur) qui peut former des dépôts sur les lentilles de contact souples, ne pas instiller ce produit directement sur les lentilles de contact souples. Attendre 15 mn avant de remettre les lentilles de contact.

Interaction médicamenteuses et autres interactions :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

les études contrôlées en période de grossesse et d'allaitement n'existent pas. En conséquence, et par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et /ou l'allaitement. Gatifloxacin ne doit être utilisé que sur avis médical.

Utilisation en pédiatrie :

la sécurité et l'efficacité de ce médicament chez les enfants de moins d'un an n'ont pas été établies.

Effets indésirables :

Brûlures locales transitoires, démangeaisons, hyperhémie conjonctivale, précipitation cristalline blanche ou bord de la paupière, quelques fois un

gout désagréable après instillation.

Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines :

Après instillation du produit, un trouble visuel passager peut se produire, le cas échéant, ne pas conduire de véhicules, ne pas utiliser de machines et attendre le retour à une vision normale.

Surdosage :

Si vous instillez trop de gouttes ou si le contenu du flacon est avalé, consultez immédiatement votre médecin.

Conservation :

A conserver à une température entre 15° et 25°C.
Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 30 jours.

Liste 1.

Date de révision de la notice : janvier 2017

DE n° : 17/17D 155/065

Fabriqué et conditionné par : GENCO-PHARM, B.P.73 voie C zone industrielle Rouïba, Alger.

Détenteur de la DE : Genericlub B.P.73 voie C zone industrielle Rouïba, Alger.