

## COMPOSITION :

Chaque ml contient :

Ofloxacin .....3.00mg

-Excipients : chlorure de sodium, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, eau ppi qsp....1ml.

-Excipients à effet notoire : chlorure de benzalkonium.

## INDICATIONS :

Traitement antibactérien local des infections oculaires sévères (conjonctivites sévères, kératites et ulcères cornéens) dues à des germes sensibles à l'ofloxacin.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

Sauf prescription médicale contraire, une à deux gouttes dans l'œil affecté de trois ou quatre fois par jour.

Un traitement de plus de 10 jours doit nécessiter un nouvel avis ophtalmologique.

Mode d'administration :

Voie ophtalmique. En instillation oculaire

## CONTRE-INDICATIONS :

-Hypersensibilité à l'ofloxacin ou à un autre médicament de la famille des quinolones.

-Hypersensibilité à l'un des excipients de ce collyre.

-l'ofloxacin n'est pas recommandé pour une utilisation chez les enfants ou les adolescents avant la fermeture épiphysite.

-Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, ni pendant l'allaitement.

## MISES EN GARDE et PRECAUTIONS D'EMPLOI :

-Ne pas injecter, ne pas avaler.

-En l'absence d'évaluation, l'utilisation de collyre à base d'Ofloxacin est déconseillée chez les nouveaux-nés.

-Comme pour les autres antibiotiques, l'usage prolongé de l'ofloxacin peut engendrer l'émergence d'une résistance par poussée d'organismes non sensibles, Y compris les mycoses, si la surinfection se produit une thérapie appropriée doit être commencée.

-il est nécessaire de recommander la prudence par rapport au risque de perforation cornéenne lors du traitement par fluoroquinolone des patients atteints d'ulcère ou d'abcès cornéen.

-Ce produit ophtalmique contient du chlorure de benzalkonium (conservateur) qui peut former des dépôts sur les lentilles de contact souples. Le port de lentilles de contact est déconseillé pendant le traitement.

-Il doit être recommandé au patient de se laver les mains soigneusement avant et après l'instillation, et lors de l'instillation ne pas toucher l'œil, les paupières surfaces avec l'extrémité du flacon.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

L'efficacité d'un collyre peut être perturbée par l'instillation d'un autre collyre .En cas de traitement concomitant par un deuxième collyre, il convient d'attendre 15 minutes avant son instillation.

## GROSSESSE et ALLAITEMENT :

Grossesse :

En l'absence d'études chez la femme enceinte, par mesure de prudence, ne prescrire ofloxacin au cours de la grossesse, que si nécessaire.

Allaitement :

L'administration de ce médicament fait contre-indiquer l'allaitement, en raison du passage des fluoroquinolones dans le lait maternel et du risque articulaire pour le nouveau-né allaité.

## EFFETS INDESIRABLES :

Sensation de brûlure ou de picotement local.

Dans une étude de tolérance de 10 sujets pendant 15 jours, aucune hyperhémie conjonctivale transitoire n'a été observée.

## SURDOSAGE :

En cas d'administration locale excessive, laver abondamment avec du sérum physiologique stérile.

## CONDUITE et UTILISATION DE MACHINES :

Possibilité de troubles de la vision liés à l'instillation du collyre. Dans ce cas ,il convient ,pendant toute la durée des troubles ,d'éviter de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines.

## CONDITIONS DE CONSERVATION :

A l'abri de la lumière .Conserver à une température inférieure à 25°C, après ouverture : utiliser dans les 15 jours.

Liste I

DE .N :

Date de révision de la notice :juillet 2016  
Détenteur de DE : GENERICLAB , zone industrielle de rouiba ,voie :C,BP :73 Algérie .

Fabricant et conditionneur : GENCOP-HARM ,zone industrielle de rouiba ,voie :C,BP :73 Algérie .