

ZOLAMIDE 20mg/ml

Dorzolamide
5ml



Solution
oculaire

COMPOSITION :

chaque 1ml contient :
le chlorhydrate de dorzolamide.....22.26mg.

Correspondant en dorzolamide base20.0mg

excipients : hydroxypropylcellulose, mannitol, citrate de sodium, hydroxyde de sodium, chlorure de benzalkonium, eau ppi.

Excipients à effet notoire : chlorure de benzalkonium.

INDICATIONS :

Ce médicament se présente sous forme de collyre en solution en flacon de 5 ml. C'est un ANTIGLAUCOMATEUX par voie locale.

INHIBITEUR DE L'ANHYDRASE CARBONIQUE.

- Zolamide solution oculaire stérile est indiqué pour faire baisser la pression oculaire chez les patients atteints d'hypertension oculaire ou de certains types de glaucomes.

-d'autres traitements du glaucome par voie locale pourront être associés à zolamide solution oculaire stérile chez certains patients

CONTRE INDICATIONS :

-si vous être allergique à l'un des constituants.

-si vous avez des problèmes rénaux sévères.

POSOLOGIE :

Voie ophtalmique.

En monothérapie : 1 goutte dans l'œil (les yeux) atteint (s), trois fois par jour.

En association à un bêta -bloquant à usage ophtalmique : 1 goutte dans l'œil (les yeux) atteint(s), deux fois par jour.

En cas de remplacement d'un autre traitement antiglaucmateaux par ZOLAMIDE : interrompre l'autre médicament après la dernière prise de la journée à la dose appropriée puis commencer ZOLAMIDE le jour suivant.

En cas d'utilisation concomitante de plusieurs collyres : les instillations successives de chaque collyre doivent être espacées d'au moins 15 minutes.

-Instillez la goutte de la solution ophtalmique dans le cul de sac conjonctival inférieur, en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas et en regardant vers le haut.

-Ne touchez pas l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon.

-Évitez tout contact de l'embout du flacon, car cela pourrait contaminer le contenu du flacon.

UTILISATION CHEZ L'ENFANT :

La tolérance et l'efficacité n'ayant pas été établies chez l'enfant, l'emploi de ce médicament n'est pas recommandé.

Respectez la prescription de votre médecin.

Si vous devez arrêter le traitement, contactez votre médecin.

MISES EN GARDES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas injecter, ne pas avaler.

-si vous porter des lentilles de contact souples, consultez votre médecin avant d'utiliser ZOLAMIDE. Ce collyre contient un conservateur, le chlorure de benzalkonium, qui peut se déposer sur les lentilles de contact souples .par conséquent, il ne doit pas être administré en présence de ces lentilles ;elles doivent être enlevées avant l'application des gouttes et ne doivent pas être remises avant un délai de 15 minutes après instillation.

- En cas de maladies du foie ou d'antécédents de maladie du foie, informez votre médecin.

-En cas de réaction allergique (éruption de la peau ou démangeaisons), arrêtez le traitement et contactez votre médecin.

-En cas d'irritation oculaire ou de tout autre symptôme oculaire (rougeur de l'œil, gonflement des paupières), n'oubliez pas d'en parler à votre médecin. En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse : Si vous être enceinte ou si vous souhaitez l'être, informez-en votre médecin .vous ne devez pas utiliser ZOLAMIDE pendant la grossesse. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement : Si vous allaitez ou si vous avez l'intention d'allaiter, informez-en votre médecin .vous ne devez pas utiliser ZOLAMIDE pendant l'allaitement.

Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

Possibilité d'effets indésirables tels qu'étourdissements et troubles de la vision pouvant altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Certaines substances contenues dans des collyres différents peuvent donner lieu à des interactions médicamenteuses : dans le doute, et sauf indications contraires de votre médecin, respectez un intervalle minimal de 15 minutes entre deux instillations dans le même œil.

Ce médicament peut interagir avec d'autres inhibiteurs de l'anhydrase carbonique pris par voie orale (acétazolamide) ou avec l'aspirine à forte dose (plus de 3 g par jour)

EFFETS INDESIRABLES :

Irritation locale, conjonctivite, kératite, œdème de la cornée, gonflement des paupières, vision floue, formation de croûtes sur le bord des paupières, larmolement, goût amer, irritation de la gorge.

Du fait du passage de la substance dans le sang : nausées, fatigue, maux de tête, étourdissements, fourmillements des extrémités, réaction allergique, lithiase urinaire.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

CONSERVATION :

Conserver le flacon dans le conditionnement extérieur d'origine, à l'abri de la lumière.

Après ouverture du flacon, le médicament peut être conservé 28 jours maximum.

Liste I

DE .N :065/17C 121/17

Date de révision de la notice : juillet 2016

Détenteur de DE : GENERICLAB, zone industrielle de rouiba, voie : C, BP : 73 Algérie.

Fabricant et conditionneur : GENCOPHARM, zone industrielle de rouiba, voie : C, BP : 73 Algérie