

ZOLAMIDE+

Dorzolamide/Timolol

20 mg/ml + 5 mg/ml / collyre 5ml

Présentation et Composition : Chaque ml contient

20 mg de dorzolamide (correspondant à 22,26 mg de chlorhydrate de dorzolamide) et 5 mg de timolol (correspondant à 6,83 mg de maléate de timolol).

excipients Hydroxyméthylcellulose, mannitol, citrate de sodium, hydroxyde de sodium, benzalkonium HCl, eau p.p.i.

Excipient à effet notoire : chlorure de benzalkonium.

Classe pharmacothérapeutique

antiglaucmateux et myotiques, bêta-bloquants, associations

Indications thérapeutiques

Zolamide+ est prescrit pour faire baisser la pression intra-oculaire élevée chez les patients présentant un glaucome lorsqu'un collyre bêta-bloquant administré seul est insuffisant.

Contre-indications

N'utilisez jamais zolamide+ :

- si vous êtes allergique à l'un des composants de ce médicament.

- si vous avez maintenu ou eu au cours de la vie des problèmes respiratoires, tels qu'un asthme ou une bronchite chronique obstructive sévère (maladie sévère des poumons pouvant entraîner des sifflements, une difficulté à respirer et/ou une toux persistante).

- si vous avez un rythme cardiaque lent, une insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme cardiaque (battements du cœur irréguliers),

- si vous avez une maladie ou des problèmes rénaux sévères ou des antécédents de calculs rénaux,

- si vous avez une acidité sanguine élevée, causée par une accumulation de chlorure dans le sang (acidose hyperchlorémique).

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales : Informez votre médecin de tout problème médical ou oculaire, passé ou présent :

- Maladie coronarienne (les symptômes peuvent inclure douleur ou oppression thoracique, essoufflement, suffocation), insuffisance cardiaque, pression artérielle basse.

- trouble du rythme cardiaque tel qu'un ralentissement des battements du cœur.

- Problèmes de respiration, asthme ou maladie pulmonaire chronique obstructive.

- Trouble de la circulation sanguine (tels que maladie de Raynaud ou syndrome de Raynaud), diabète car le timolol peut masquer les signes et les symptômes d'une hypoglycémie (taux de sucre bas dans le sang).

- hyperactivité de la glande thyroïde car le timolol peut en masquer les signes et les symptômes.

Informez votre médecin avant d'être opéré que vous prenez Zolamide+ car le timolol peut modifier l'action de certains médicaments utilisés pour l'anesthésie.

Informez également votre médecin de toute réaction allergique y compris urticaire, gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et/ou de la gorge qui peut entraîner une difficulté à respirer ou à avaler.

Informez votre médecin si vous avez des faiblesses musculaires ou si une myasthénie a été diagnostiquée.

En cas d'irritation oculaire ou de l'apparition de tout autre symptôme oculaire tel que rougeur de l'œil ou gonflement des paupières, contactez votre médecin immédiatement.

Si vous sentez que Zolamide+ est à l'origine d'une réaction allergique ou d'une hypersensibilité (par exemple, éruption de la peau, éruption cutanée sévère ou rougeur de l'œil et démanchement oculaire), arrêtez le traitement et contactez votre médecin immédiatement.

Informez votre médecin en cas d'infection oculaire, de blessure oculaire, d'intervention chirurgicale oculaire, ou de réaction avec des symptômes nouveaux ou une aggravation de vos symptômes.

Quand Zolamide+ est instillé dans l'œil, il peut avoir un effet sur l'ensemble de l'organisme.

Si vous portez des lentilles de contact souples, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

Utilisation chez l'enfant :

- l'expérience chez le nourrisson et l'enfant est limitée.

Utilisation chez les personnes âgées

Dans des études avec zolamide+, les effets ont été similaires chez les patients âgés et chez les patients plus jeunes.

Utilisation chez l'insuffisant hépatique

Informez votre médecin de tous problèmes hépatiques que vous avez ou avez eus par le passé.

Interactions médicamenteuses :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris d'autres collyres ou des médicaments délivrés sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci est particulièrement important si :

- vous prenez des médicaments pour diminuer la pression artérielle ou pour traiter une maladie cardiaque (tels qu'un inhibiteur calcique, bêta-bloquant ou digoxine),

- vous prenez des médicaments pour traiter un rythme cardiaque irrégulier ou perturbé tels qu'un inhibiteur calcique, un bêta-bloquant ou de la digoxine,

- vous utilisez un autre collyre qui contient un bêta-bloquant,

- vous prenez un autre inhibiteur de l'anhydrase carbonique tel que l'acétazolamide,

- vous prenez un médicament de la famille des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), vous prenez un médicament parasymphatomimétique qui

vous a été prescrit pour vous aider à uriner. Les parasymphatomimétiques appartiennent à une famille de médicaments qui sont parfois également utilisés pour aider à la restauration d'un transit intestinal normal.

- vous prenez des narcotiques tels que la morphine utilisés pour traiter des douleurs modérées à fortes,

- vous prenez un médicament pour traiter le diabète,

- vous prenez un médicament antidépresseur,

- vous prenez un médicament de la classe des sulfamides.

Grossesse et allaitement

Grossesse : N'utilisez pas Zolamide+ si vous êtes enceinte à moins que votre médecin ne le juge nécessaire.

Allaitement : N'utilisez pas Zolamide+ si vous allaitez. Le timolol peut passer dans le lait maternel. Demandez conseil à votre médecin avant de prendre un médicament pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Il existe des effets indésirables associés à Zolamide+, tels qu'une vision trouble qui peut altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines. Ne pas conduire ou utiliser de machines avant que vous ne vous sentiez bien ou que votre vision soit claire.

Posologie :

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose recommandée est une goutte dans l'œil (les yeux) atteint(s), matin et soir.

Si vous utilisez ce médicament avec un autre collyre, les installations successives de chaque collyre doivent être espacées d'au moins 15 minutes.

Ne modifiez pas la posologie de ce médicament sans en avertir votre médecin.

Évitez de mettre en contact le flacon et l'œil ou les parties avoisinantes de l'œil. Il pourrait en effet se contaminer par des bactéries provoquant une infection oculaire qui pourrait entraîner des lésions graves de l'œil, voire même la perte de la vision. Afin d'éviter toute contamination du flacon, lavez-vous les mains avant utilisation de ce collyre et maintenez l'embout du flacon éloigné de tout contact. Si vous pensez que votre médicament a pu être contaminé ou si vous présentez une infection oculaire, contactez immédiatement votre médecin afin de savoir si vous pouvez réutiliser ce flacon.

Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, Zolamide+ est susceptible d'avoir des effets

indésirables, bien que tous les patients n'y soient pas sujets.

Si vous ressentez l'un d'eux, vous pouvez avoir besoin d'une prise en charge médicale. Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec Zolamide+ ou l'un de ses composants :

Très fréquent : Brûlures et picotements des yeux, altération du goût.

Fréquent : Rougeur de/ou autour de l'œil ou des yeux, larmolement ou démanchement de l'œil ou des yeux, et/ou effet sur la surface de l'œil et/ou des yeux, gonflement et/ou irritation de/et autour de l'œil ou des yeux, lésions croûteuses palpébrales, douleur oculaire, yeux secs, vision trouble, maux de tête, sinusite, nausées et fatigue.

Peu fréquent : Entourdissement, dépression, inflammation de l'iris, troubles visuels dont changement de réfraction (dû à l'interruption d'un traitement par collyre myotique dans certains cas), rythme cardiaque lent, évanouissement, indigestion et calculs biliaires.

Rare : Lupus érythémateux disséminé, fourmillement ou engourdissement des mains ou des pieds, insomnies, cauchemars, perte de mémoire, faiblesse des muscles, diminution de la libido, accident vasculaire cérébral, myopie transitoire qui peut causer l'arrêt du traitement, décollement de la choroïde (après chirurgie filtrante), ptosis (chute de la paupière supérieure), vision double, bourdonnements dans les oreilles, pression artérielle basse, rythme cardiaque irrégulier, douleur thoracique, palpitations, crise cardiaque, gonflement ou froidure des mains et des pieds, mauvaise circulation des bras et des jambes, crampes et/ou douleur des jambes pendant la marche (claudication), essoufflement, détresse respiratoire, rhinite, saignement de nez, bronchospasme (prédominant chez les patients avec bronchospasme préexistant), toux, irritation de la gorge, sécheresse buccale, diarrhée, dermatite de contact, perte de cheveux, psoriasis ou aggravation de psoriasis, maladie de La Peyronie (pouvant causer une courbure du pénis), faiblesse/fatigue, réactions de type allergique telles que rash, urticaire, démanchements, en de rares cas gonflement des lèvres, des yeux et de la bouche, éruption siffante ou réactions cutanées sévères.

Si l'un des effets indésirables devient sévère, ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Conservation :

Conservez le flacon dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

Vous pouvez utiliser Zolamide+ pendant 28 jours après la première ouverture du flacon.

Liste I

DE N° 17/065C 17/141

Date de révision de la notice : février 2017

Détenteur de DE : GENERICLAB, ZI de rouiba ,voie C, BP :73 Algérie.

Fabricant et conditionneur : GENCOPHARM, ZI de rouiba ,voie C, BP :73 Algérie .