TRAVADROP®
Travoprost
40 µg/ml

1- Composition pour 100 ml :
Travoprost……0.004g
Excipients: polyquaternium, huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée, acide borique, mannitol, chlorure de sodium, propylène glycol, hydroxyde de sodium et/ou acide chlorhydrique, eau ppi.
Excipient à effet notoire : polyquaternium-1, huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée, propylène glycol.

2- Forme et présentation :
Collyre en Solution-flacon de 2.5ml
Classe pharmaco–thérapeutique : antiglaucomateux et myotiques analogues des prostaglandines.

3- Indications cliniques :
Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients adultes atteints d'hypertonie intraoculaire ou de glaucome à angle ouvert.
Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients pédiatriques âgés de 2mois à 18ans atteints d'hypertonie intraoculaire ou de glaucome pédiatrique.

4- Posologie et voie d'administration :
- La posologie est d'une goutte dans l'oeil ou les yeux atteint(s) une fois par jour.
- L'effet du travoprost est optimal si le traitement est administré le soir.
- La posologie ne doit pas dépasser une goutte par jour dans l'oeil ou les yeux atteint(s).
- Une occlusion nasolacrymale ou une fermeture douce des paupières après administration est recommandée. Ceci peut réduire l'absorption systémique des médicaments administrés par voie oculaire et conduire à une diminution des effets indésirables systémiques.
- En cas d'utilisation de plusieurs collyres, les médicaments doivent être administrés avec au moins 15 minutes d'écart.
- En cas d'oubli, le traitement doit être poursuivi avec l'instillation suivante comme prévu. La posologie ne doit pas dépasser une goutte par jour dans l'oeil ou les yeux atteint(s).
- En cas de remplacement d'un autre médicament antiglaucomateux ophtalmique par du travoprost en collyre, l'autre médicament doit être interrompu et le travoprost en collyre doit être commencé le jour suivant.

Population pédiatrique :
TRAVADROP® collyre peut être utilisé chez les patients pédiatriques agés de 2 mois à 18 ans à la même posologie que chez l'adulte.

5- Contre–indications :
Hypersensibilité connue à l'un des constituants du médicament.

6- Précautions et mises en garde :
-TRAVADROP® peut augmenter la longueur, l'épaisseur, la couleur et/ou le nombre de vos cils. Des changements au niveau des paupières, y compris une pilosité anormale, ou au niveau des tissus autour des yeux ont également été observés.
-TRAVADROP® peut modifier la couleur de votre iris (la partie colorée de votre oeil). Ce changement peut être permanent. Un assombrissement des paupières peut également survenir.
-Si vous avez eu une chirurgie de la cataracte, adressez-vous à votre médecin avant d'utiliser TRAVADROP®.
-Si vous avez ou avez déjà eu une inflammation de l'oeil (iritis et uvéite), adressez-vous à votre médecin avant d'utiliser Travadrop.
-TRAVADROP® peut, à de rares occasions, provoquer des essoufflements ou une respiration sifflante, ou augmenter les symptômes de l'asthme. Si vous observez des changements dans votre manière de respirer lorsque vous utilisez TRAVADROP® prévenez immédiatement votre médecin.
-TRAVADROP® peut être absorbé par la peau. En cas de contact accidentel avec le contenu du flacon, laver immédiatement la zone concernée. Ceci est particulièrement important pour les femmes enceintes ou souhaitant le devenir.
-Si vous êtes porteur de lentilles de contact souples, n'utilisez pas le collyre lorsque vous portez vos lentilles. Après avoir utilisé le collyre, attendez 15 minutes avant de remettre vos lentilles.

7- Effets indésirables :
Comme tous les médicaments, TRAVADROP® est susceptible d'avoir des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas chez tous le patients.
Vous pouvez continuer à utiliser le collyre, à moins que ces effets secondaires soient graves .Si vous vous inquiéter, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Ne pas interrompre l'administration de TRAVADROP® sans en parler à votre médecin.
Effets indésirables très fréquents : (survient chez plus d'1 personnes sur 10) Effets oculaires : rougeur.
Effets indésirables fréquents :
(survient chez 1 à 10 personnes sur 100)
Effets oculaires : Douleur, irritation, oeil sec, démangeaison, changement de la couleur de l'iris (partie colorée de l'oeil), gêne oculaire.
Effets indésirable peu fréquent ou rares:
(survient chez 1 à 10 personnes sur 1000)
Effets oculaires: inflammation ou infection de la conjonctive (conjonctivite) ou de la cornée, effet de halo, troubles cornéens, allergie, yeux fatigués, augmentation de la taille de la pupille dyschromie cutanée, Inflammation dans l'oeil, Gonflement, sensibilité à la lumière, vision floue, réduite ou anormale, écoulement, augmentation de la production des larmes, sensation anormale ou diminué, rougeur, gonflement ou croutes des paupières, coloration des cils, augmentations ou diminution de la pousse ou du nombre de cils, changement de la couleur de l'iris (partie colorée de l'oeil).
Effets généraux: maux de tête et assombrissement de la peau autour des yeux, asthme, diminution du souffle, augmentation ou diminution de la pression artérielle, rythme cardiaque irrégulier, étourdissements, infection virale, toux, fatigue généralisée, augmentation des symptômes allergiques, irritation de la gorge, nez bouché , changement de la voix, inconfort gastro- intestinal ou ulcère, bouche séche, constipation, rougeurs ou démangeaisons cutanées, douleurs articulaires, mauvais gout.
Des effets indésirables supplémentaires ont été rapportés : Affections de la peau et du tissu sous cutané : hyperpigmentation cutanée.

8- Grossesse et allaitement :
N'utilisez pas TRAVADROP® si vous êtes enceinte. Si vous pensez être enceinte, parlez-en à votre médecin aussitôt. Si vous pouvez être enceinte, utilisez un moyen de contraception adéquat pendant l'utilisation de ce collyre.
N'utilisez pas TRAVADROP® si vous allaitez, TRAVADROP® peut passer dans votre lait.

9- Conduite et utilisation de machines :
En cas de vision floue survenant lors de l'instillation, le patient doit attendre que sa vision redevienne normale avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine.

10- Surdosage :
Un surdosage oculaire peut être rincé avec de l'eau tiède.

11- Conservation :
A l'abri de la lumière.
Après la 1ère ouverture du flacon, utiliser dans un délai de 4 semaines.

LISTE I
DE.n° : 065/17C 139/21
Date de révision de la notice : Decembre 2020
Détenteur de DE : GENERICLAB, Zone industrielle Rouiba, voie: C, BP : 73 Alger, Algérie.
Fabricant et conditionneur: GENCOPHARM, Zone industrielle Rouiba, voie: C, BP : 73 Alger, Algérie.

Genericlab