

Produit : NOTICE_AR_OPADEX®	 FICHER NON IMPRIMABLE
Dimensions :	
Couleurs :  	

محلول معقم للعين	3
قارورة 5 مل	3
ديكساميثازون 1 مغ/مل	3
نيوميسين 3500 ود/مل	3
أوبادكس	3
1- التسمية التجارية : أوبادكس®	3
2- التسمية المشتركة الدولية :	3
ديكساميثازون صوديوم فوسفات،	3
نيوميسين فوسفات،	3
3- المقدار، الشكل الصيدلاني والمحتوى :	3
قطرات للعين 1 مغ/مل و 3500 ود/مل، علبة بها قارورة واحدة سعة 5 مل.	3
4- التركيبة النوعية والكمية : في 1 مل من المحلول المعقم العين	3
ديكساميثازون.....1.1 مغ	3
ما يعادل ديكساميثازون صوديوم فوسفات.....1.3 مغ	3
نيوميسين فوسفات.....3500 ود	3
المواد :	3
كلوريد البنزالكونيوم، حمض البوريك، إيثينات الصوديوم، دي صوديوم ريباعي بورات، كريمةوفر RH35، هيدروميلون، ماء للحقن.	3
5- قائمة السموات ذات التأثير المعروف :	3
كلوريد البنزالكونيوم، فوسفات،	3
6- دواعي الاستعمال :	3
هذا الدواء عبارة عن قطرات معقمة للعين تحتوي على:	3
• مضاد حيوي من عائلة الأمينوزيد: النيوميسين	3
• والكورتيزون: الديكساميثازون.	3
هذا الدواء مخصص للعلاج الموضعي لبعض التهابات وعوى العين :	3
– بعد جراحة العين	3
– في حالات التهاب بسبب البكتريا التي يمكن أن يجارها المضاد الحيوي الموجود في الدواء	3
7- معايير الجرعة وطريقة تناول :	3
الجرعة : قطر قطرة واحدة في العين المصابة بمعدل 3 إلى 6 مرات في اليوم لمدة 7 أيام.	3
طريقة الاستعمال : عن طريق العين.	3
اغسل يدك	3
• خذ القارورة وزرع الغطاء عن طريق فكها.	3
• بعد إزالة الغطاء، إذا كانت حلقة الأمان فضفاضة للغاية، فقم بإزالتها قبل استخدام المنتج.	3
• امسك القارورة رأساً على عقب بين إبهامك وأصبعك الأوسط.	3
• اثني رأسك للخلف، لصابع نظيف، اسحب جفك برفق للأعلى لعمل تجعد بين الجفن والعين. سيتم تقطير القطرة هناك.	3
• خذ طرف القارورة من عيناك، إذا لزم الأمر، استخدم مرآة.	3
• لا تلمس عينك أو جفحك أو الأسطح الأخرى بالقطارة. هذا يمكن أن يصيب قطرات العين	3
المتبقية في القارورة.	3
• اضغط برفق على قاعدة القارورة لتحرير قطرة واحدة من أوبادكس® في كل مرة.	3
• لا تضغط على القارورة، فهي مصممة بحيث يكون الضغط الخفيف فقط على القاعدة ضرورياً.	3
• إذا كنت بحاجة إلى علاج كلتا العينين، كرر هذه الخطوات للعين الأخرى.	3
• أغلق القارورة بإحكام بعد الاستعمال مباشرة.	3
• إذا فقدت إحدى القطرات خارج عينك، حاول مرة أخرى.	3
وتيرة الاستعمال :	3
في المتوسط من 3 إلى 6 عمليات تقطير لكل عين مريضة توزع على مدار اليوم.	3
مدة العلاج :	3
في المتوسط 7 أيام.	3
يمكن وصف علاج أطول أو تقطير أكثر تكراراً تحت إشراف صامرن من طب العيون.	3
في جميع الحالات ، اتبع بدقة وصف طبيبك.	3
إذا نسبت أن تضع جرعة ، ضعها في أسرع وقت ممكن ، إلا إذا كان الوقت قد حان للجرعة التالية. في هذه الحالة ، استأنف علاجك كما هو موصوف من قبل طبيبك.	3
8- دواعي عدم الاستعمال : لا تستخدم إذا أوبادكس® :	3
• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه المواد الفعالة أو أي من المواد.	3
• إذا كنت تعاني من التهابات معينة في القرنية (التهاب القرنية التضخمي الهيرسي، التهاب القرنية الفطري) ،	3
• إذا كان لديك التهابات فطرية والسيل في العين.	3
• إذا كان لديك تاريخ شخصي أو عائلي من الإصابة بالجلكوما.	3
• إذا كنت تعاني من التهاب القرنية والملمحة والتهاب العين في مرضى ميكبة.	3
• إذا كان لديك التهابات فيجي في الجفون والعين ناتجة عن الجراثيم المقاومة للنيوميسين.	3
• إذا كان لديك شك ، فمن الضروري أن تأتلف طبيبك أو الصيدلي.	3
9- احتياطات الاستعمال والتحذيرات الخاصة :	3
تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من التورم وزيادة الوزن في جسمك ووجهك لأن هذه علامة من تلك العلامات	3
التي قد تكون سبباً لتضخم كوشينغ. قد يحدث تثبيط لوظيفة الغدة الكظرية بعد التوقف عن العلاج طويل الأمد أو	3
المكثف باستخدام أوبادكس®. تحدث إلى طبيبك قبل التوقف عن العلاج بنفسك. هذه المخاطر مهمة بشكل خاص	3
عند الأطفال والمرضى المتعاطين بدواء يسمى ريتونايفير أو كوبيسيستات.	3
اتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية أو اضطرابات بصرية أخرى.	3
تحذيرات خاصة :	3
لا يبلع ، لا يستخدم المصاحب بقطرة أخرى للعين ، باعد بين القطرات مدة 15 دقيقة.	3
يمكن أن يؤدي التقطير المتكرر و / أو المطول لقطرات العين إلى مرور نظامي معطر للمكونات الفعالة.	3
قد يتسبب التقطير المتكرر و / أو المطول في ارتفاع ضغط العين لدى بعض المرضى و / أو تأخر الشفاء.	3
يتكون هذا الدواء على 0.5 مغ من كلورور البنزالكونيوم في 5 مل من المحلول، أي ما يعادل 0.1 مغ/مل.	3